治療和預防 COVID-19 的藥物

如果你有罹患 COVID-19 重症的高風險[±]，請立即聯繫醫生，即使你的症狀很輕微。如果你的 COVID-19 檢測結果呈陽性，你可能有資格獲得*治療* COVID-19 並幫助你免於住院的藥物。**不要拖延：當症狀出現後，儘快用藥的效果最好。**

請諮詢你的醫生。如果你需要幫助尋找一名醫生，請致電 2-1-1。你也可以致電公共衛生局呼叫中心熱線：**1-833-540-0473**，該熱線的服務時間為上午 8:00 至晚上 8:30（一週七天）。

可預防或治療 COVID-19 的藥物有兩種：

- **抗病毒藥物**可以阻止病毒在體內「繁殖」
- **單克隆抗體**會與病毒結合，幫助身體除掉病毒

目前，*無需*為這些 COVID-19 藥物支付費用，但治療機構可能會對施用藥物收費。Medicare（聯邦醫療保險）和 Medicaid（州醫療補助）將報銷*所有*費用。如果你有私人保險，請查看你的保險計劃，看看它是否可報銷所有的費用。如果你沒有保險，請詢問治療機構是否需要支付一定的費用。

只接受由醫療服務提供者開處方的治療。有人在服用未經授權的治療 COVID-19 的產品後受到嚴重傷害，甚至死亡。這包括被批准和/或開處方用於其他用途的產品。

治療 COVID-19 的藥物

這些治療方法適用於輕度到中度症狀的個人。它們有助於預防嚴重症狀和住院治療。這些治療方法越早開始效果越好。

下列藥物須*口服*，並應在出現症狀後的 *5 天內*開始服用。一項新的「從檢測到治療」(Test to Treat) 計劃允許人們去參與計劃的藥店和診所進行檢測。如果檢測結果呈陽性，可以當場獲得這些藥物。若需找到提供「從檢測到治療」服務的地點，或欲瞭解更多資訊，請訪問 ph.lacounty.gov/covidmedicines.

- **Paxlovid**（抗病毒藥物）——適用於 12 歲及以上的體重至少 88 磅的個人
- **Molnupiravir***（抗病毒藥物）——適用於 18 歲及以上的成年人。不建議孕婦使用此藥物。

以下藥物需透過*靜脈注射*，並應在出現症狀的 *7 天內*開始使用。

- **Bebtelovimab***（單克隆抗體）—— 適用於 12 歲及以上的體重至少為 88 磅的個人
- **Remdesivir**（抗病毒藥物）——適用於任何年齡段的體重至少為 8 磅的個人。每天需注射一次，連續 3 天。

*只有在沒有其他藥物的情況下，才推薦使用這些治療方法。

治療和預防 COVID-19 的藥物

預防 COVID-19 的藥物

如果你因為醫學原因無法接種 COVID-19 疫苗，或者你的免疫系統不夠強大，無法讓疫苗正常起效，請向你的醫生諮詢 Evusheld。它是一種**預防** COVID-19 的藥物，且必須在你感染 COVID-19 之前使用。

Evusheld（單克隆抗體藥物）——適用於 12 歲及以上的體重至少為 88 磅的個人。單次治療需進行兩次肌肉注射。

如果你對 COVID-19 藥物有任何疑問，請聯繫你的醫生。
如需瞭解更多資訊，以及找到一處提供治療藥物的地點，
請訪問 ph.lacounty.gov/covidmedicines。

COVID-19 治療藥物並不是 COVID-19 疫苗的替代性選擇。

COVID-19 疫苗安全有效且免費，并且在整個洛杉磯縣可廣泛接種。疫苗可以保護你和其他人免於感染 COVID-19。

± 罹患 COVID-19 重症的高風險人群包括：

- 65 歲及以上的老年人

以及有以下情況的任何年齡的個人：

- 患有癌症
- 患有慢性腎病、肝病或肺病
- 患有囊性纖維化疾病
- 患有癡呆或其他神經系統疾病
- 患有糖尿病(1 型或 2 型)
- 身體殘障
- 患有心臟病
- 愛滋病病毒感染
- 免疫系統薄弱
- 患有心理健康疾病
- 超重和肥胖
- 缺乏身體活動
- 懷孕
- 患有鐮狀細胞疾病或地中海貧血
- 現在吸煙或有吸煙史
- 進行過實體器官或血液幹細胞移植
- 患有中風或腦血管疾病
- 物質使用障礙症
- 患有結核病

此清單並未囊括所有可能的情況。
如果你認為你可能有高風險，請諮詢你的醫生。